



Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Landbrugsstyrelsen



Fig. 1: Oliven med visne bladspidser afgrænset af rødbrun kant mod det friske væv. Kilde: EPPO



Fig. 2: Kaffeplante med visne og begyndende gulfarvning af blade. Kilde: Landbrugsstyrelsen



Fig. 3. Oliventræ med kraftigt angreb. Kilde: EPPO

Hold øje med *Xylella fastidiosa*

Bakterien *Xylella fastidiosa* er en karantæne-skadegører, der kan angribe over 300 plantearter, heriblandt økonomisk vigtige afgrøder som oliven, citrus, vin, valnød og blomme. *Xylella fastidiosa* opformerer sig i planten og forhindrer transporten af vand og næring i planten. Ved alvorlige angreb kan planten visne og dø.

Efter første fund i Italien i 2013 er den også fundet i Frankrig, Spanien og Portugal, og der er nu stor fokus på at undgå, at bakterien spredes yderligere i EU.

Symptomer på angreb

Ved milde angreb kan *Xylella fastidiosa* forekomme uden symptomer i planten, og kun ved at teste plantematerialet kan man afsløre angreb. Planter kan smitte uden selv at udvise symptomer.

Ved svære angreb kan symptomerne ses som bladvisninger, blade med gule pletter, lyse blade eller visne bladspidser, der er afgrænset af en gul eller rød kant mod det friske væv. Symptomerne afhænger af værtplanten (fig. 1-4) og hvilken underart af bakterien, der angriber.




Fig. 4 *Pelargonium* angrebet af underarten *Xylella fastidiosa* subsp. *multiplex*. Kilde: Ministère de l'Agriculture de l'Agroalimentaire et de Forêt France

Hvilke planter angriber bakterien?

Bakterien er opdelt i 4 underarter:

- *Xylella fastidiosa* subsp. **fastidiosa**
- *Xylella fastidiosa* subsp. **pauca**
- *Xylella fastidiosa* subsp. **multiplex**
- *Xylella fastidiosa* subsp. **sandy**

Tilsammen kan de angribe over 300 dyrkede og vilde plantearter, både urte- og vedagtige. De forskellige underarter har forskelligt værtregister, men med et vist overlap.

I tabellen herunder kan du se de vigtigste værtplanter, som de 4 underarter angriber, og underarternes foreløbige kendte udbredelsesområder.

Tabel 1. Underarter, foreløbig udbredelse og eksempler på værtplanter

Underart	Fundet i	Vigtige værtplanter
fastidiosa	Spanien (Balearerne ¹) Frankrig	Vin, citrus, kaffe og mandel
pauca	Italien Spanien (Balearerne) Frankrig	Citrus, kaffe og oliven
multiplex	Spanien (Balearerne) og på fastlandet Frankrig	Oliven, mandel, fersken, blomme, abrikos, eg, solsikke m.fl.
sandy	Endnu ikke fundet i EU	Nerie, Jacaranda og Magnolie

¹ Øgruppen Balearerne omfatter Mallorca, Menorca og Ibiza



Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Landbrugsstyrelsen

Hvor findes bakterien?

Xylella fastidiosa er udbredt i Nord-, Mellem- og Sydamerika, samt på Taiwan.

I Europa blev bakterien fundet første gang i 2013 på oliven i Italien, og efterfølgende i Frankrig, Spanien og Italien på forskellige plantearter. Den har gjort stor skade i de angrebne lande hvor den efterhånden er fundet på ca. 300 værtplanter (afhængig af undergruppe), herunder en række danske kulturplanter.

I EU-lande med angreb kæmper plantesundhedsmyndighederne for at opspore, inddæmme og udrydde skadegøreren.

Xylella fastidiosa trives generelt godt under varme forhold, men især underarten *multiplex* kan også spredes under mere kølige forhold. Det forventes derfor, at især *multiplex* vil kunne etablere sig under danske forhold og angribe planter som eg, blomme og surkirsebær. Væksthusproduktion i Danmark af mange andre værtplanter kan også være udsat.

Hvordan spredes *Xylella fastidiosa*?

Bakterien spredes naturligt over korte afstande med insekter som f.eks. småcikader og skumcikader (fig. 5). Når de har suget saft fra en inficeret plante, kan de overføre bakterien til en rask plante. Over store afstande kan bakterien spredes ved handel og transport af inficerede planter.



Fig. 5 Skumcikader *Philaneus spumarius*. Kilde: ANSES

Hvorfor er skadegøreren så alvorlig?

Xylella fastidiosa overføres nemt fra plante til plante med mange forskellige og vidt udbredte insekter. Bakterien opformeres i plantens væv og forhindrer transporten af vand og næring i planten (Fig. 6). Bakterien kan optræde symptomfrit i planten i lang tid, og kan være spredt til mange planter, før de første symptomer viser sig.

Bakterien kan ikke bekæmpes med pesticider, og angrebne planter skal derfor destrueres. For stiklinger og småplanter i hvile kan varmtvandsbehandling med 50° varmt vand i 45 minutter dræbe bakterien, uden at planten tager skade.



Fig. 6 Bakterien har tilstoppet si-vævet, der farves mørk
Kilde: EPPO, Univerita Degli Studi di Bari

Ved truslen om de store økonomiske konsekvenser et angreb kan få på produktionen af især citrus, vin og oliven, har EU indført skrappe plantesundhedsmæssige krav til, hvordan man undgår yderligere spredning. Det involverer blandt andet, at værtplanter sættes i karantæne i 10 km. radius ved fund af en angrebet plante. Du kan læse mere om EU's seneste hasteforanstaltninger [her](#).

Hvad kan du selv gøre for at undgå angreb?

- Brug udelukkende kontrollerede friske småplanter
- Hold varemottagelse og planteproduktion fysisk adskilt og undersøger nøje de indkøbte planter
- Se efter symptomer på bakterieangreb
- Hold frasorterede planter og plantemateriale adskilt fra produktionen
- Tag ikke stiklinger med hjem fra rejser.

Hvad gør Landbrugsstyrelsen?

Hvis *Xylella fastidiosa* findes i Danmark, vil Landbrugsstyrelsen undersøge omfanget af angrebet, forhindre yderligere spredning og sikre, at angrebne planter udrykkes i overensstemmelse med EU's hasteforanstaltninger.

Hvem skal kontaktes

Ved fund eller mistanke om forekomst af *Xylella fastidiosa*, skal du kontakte Landbrugsstyrelsen:

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Landbrugsstyrelsen
Planter & Biosikkerhed
Nyropsgade 30, 1780 København V
Tlf: 3395 8000
planter&biosikkerhed@lbst.dk, www.lbst.dk